



台灣



圖鑑

A Field Guide to Wild Fruits of Taiwan

黃麗錦 著



目錄

Contents

作者序	004
-----	-----

紅色野果圖鑑

01 粗糠柴	006
02 玉山小蘗	008
03 阿里山五味子	010
04 冇骨消	012
05 姑婆芋	014
06 柚葉藤	016
07 過山香	017
08 海欖果	018
09 水丁香	020
10 野鴉椿	022
11 風藤	024
12 九節木	026
13 台灣茶藨子	028
14 假人參	030
15 野牡丹	032
16 台灣胡麻花	034
17 台灣藜蘆	036
18 山桐子	038
19 楊梅	040
20 厚葉衛矛	042
21 山月桃	044
22 青牛膽	046

橙色野果圖鑑

23 毛柿	048
24 構樹	050
25 台灣海桐	052
26 山黃梔	054
27 山苦瓜	056
28 水麻	058
29 變葉懸鉤子	060
30 穿鞘花	062

黃色野果圖鑑

31 蟲屎	064
32 台灣魚木	066
33 毛西番蓮	068
34 雞屎藤	070
35 黃藤	072
36 栓皮櫟	074
37 車桑子	076
38 猿尾藤	078
39 棟樹	080
40 黃杞	082

白色野果圖鑑

41 小白頭翁	084
42 酸藤	086
43 水晶蘭	088
44 同蕊草	090
45 草海桐	092
46 水柳	094
47 長梗紫麻	096
48 咬人狗	098
49 水冬瓜	100
50 檫樹	102

綠色野果圖鑑

51 蔞菜	104
52 裡白巴豆	106
53 大葉山欖	108
54 烏心石	110
55 平伏莖白花菜	112
56 黑板樹	114
57 阿拉伯婆婆納	116
58 欖仁樹	118
59 蛇根草	120
60 馬齒莧	122
61 梅花草	124
62 肉穗野牡丹	126

⑥3 白水木	128
⑥4 酢漿草	130
⑥5 七葉一枝花	132
⑥6 青楓	134
⑥7 豨薟	136

藍色野果圖鑑



⑥8 流蘇樹	138
⑥9 台灣冷杉	140
⑦0 旅人蕉	142
⑦1 圓葉雞屎樹	144
⑦2 桔梗蘭	146
⑦3 漢氏山葡萄	148
⑦4 杜若	150
⑦5 扛板歸	152
⑦6 海州常山	154

紫色野果圖鑑



⑦7 杜虹花	156
⑦8 桃金娘	158
⑦9 台灣土黨參	160
⑧0 金錢豹	162
⑧1 普刺特草	164
⑧2 台灣野牡丹藤	166
⑧3 山棕	168
⑧4 雷公根	170

褐色野果圖鑑



⑧5 九芎	172
⑧6 大花紫薇	174
⑧7 蓖麻	176
⑧8 蔓烏頭	178
⑧9 蘭嶼肉豆蔻	180
⑨0 台灣馬醉木	182
⑨1 相思樹	184
⑨2 車前草	186
⑨3 水鴨腳	188

⑨4 大頭茶	190
⑨5 盒果藤	192
⑨6 老鶴草	194
⑨7 倒地鈴	196
⑨8 山菜豆	198
⑨9 三星果藤	200
⑩0 台灣赤楊	202
⑩1 野棉花	204
⑩2 銀葉樹	206
⑩3 毛果竹葉菜	208
⑩4 竊衣	210
⑩5 水芫花	212

黑色野果圖鑑



⑩6 山黃麻	214
⑩7 壺花莢蒾	216
⑩8 燈稱	218
⑩9 三角葉西番蓮	220
⑩10 白珠樹	222
⑩11 能高大山紫雲英	224
⑩12 台灣青莢葉	226
⑩13 黑果深柱夢草	228
⑩14 雞屎樹	230
⑩15 台灣馬桑	232
⑩16 台灣海棗	234
⑩17 鱧腸	236
⑩18 虎葛	238
⑩19 樟樹	240
⑩20 火炭母草	242
⑩21 馬藍	244
⑩22 厚葉石斑木	246

學名索引	248
英名索引	250
中名索引	253
參考書目	255



WILD
FRUITS

01



紅色野果

粗糠柴

KAMALA
TREE

- ① 唯有結果時，紅色的果串高掛枝端，才會引起人們注意。
- ② 粗糠柴的雄花。
- ③ 雌花序，可見羽絨狀的柱頭。
- ④ 授粉後，子房膨大孕育為果實。子房有紅色腺體，已變為紅色。
- ⑤ 果實表面有紅色的腺體，形成顆粒粉末狀，密集包覆著果實。



②

學名	<i>Mallotus philippensis</i>
科屬	大戟科野桐屬
英名	Kamala Tree, Monkey Face Tree
型態	常綠喬木
分布	低海拔闊葉樹林
特徵	葉片是略為菱形的橢圓形葉，互生，具三出脈，葉基具一對腺體。總狀花序頂生或腋生，單性花，雌雄同株或異株，花被3~4枚，雄蕊多數，雌蕊柱頭三裂，羽絨狀。蒴果，三角立體狀，種子黑色。
花期	3~5月
果期	5~8月
傳播方式	自力傳播
有毒部位	果實



③

④



由於全株的枝葉具有米糠狀的鱗片，而且材質輕軟可當薪柴，因而被命名為「粗糠柴」。廣泛分布於低海拔山區，是喜愛陽光的陽性植物。與野桐及白匏子為同一家族的成員，生育環境類似，有時在同一區域可以發現三者同時生長。不結果時，不易讓人發現到它的存在。全株具有黃褐色的短毛，葉背散生著紅褐色的圓形腺點，果實具有紅色腺體，可做為與其

他兩者的區別。

花單性，雌雄異株或同株，有時雄花及雌花位於同一花序上。黃褐色的花長得細小而不顯眼，但因具有花外蜜腺，吸引許多昆蟲前來訪花。果實三室，每室中有一粒種子，這是大戟科家族的共同特徵之一。成熟的果實外表具有一層橘紅色的粉末，早期被人們拿來製作成紅色的染料。



WILD
FRUITS
23

①



橙色野果

毛柿

TAIWAN
EBONY

- ① 毛柿是野生的柿子，成熟的果實可食。
- ② 種子為長卵形，一顆果實有4粒種子。
- ③ 毛柿的雄花，數量較多，常3至7朵聚集生長在一起，密披細毛。
- ④ 毛柿的雌花，通常單生，花數常為4。
- ⑤ 果實密披黃褐色的絨毛。
- ⑥ 果實具有增大的宿存萼片，果熟為橘紅色。



②

小檔案

學名	<i>Diospyros philippensis</i>
科屬	柿樹科柿樹屬
英名	Mabolo, Taiwan Ebony, Velvet Apple
型態	常綠喬木
分布	東部及南部海岸
特徵	長橢圓形葉，互生，革質，表面光滑，葉背灰白色，有長柔毛。單性花，雌雄異株，花黃白色，花萼密披長柔毛，花冠壺形；雄花多數聚生，雌花單生，花冠裂片與雄蕊、雌蕊數常為4，具芳香。漿果，扁球形，橘紅色，密披毛。
花期	3~6月
果期	5~9月
傳播方式	動物取食傳播



③



④



毛柿

毛柿是野生的柿樹，分布於高雄至恆春半島及台東、花蓮的低海拔地區及近海的森林中。由於心材漆黑，材質堅硬，又有台灣黑檀之稱，和烏心石、欖木、台灣檫樹、牛樟並稱為台灣的闊葉樹五木。由於遭到大量的砍伐，野外植株的數量愈來愈少，被列為瀕臨滅絕的植物。

名之為毛柿，顧名思義便是全株密披絨毛，包含葉柄、葉背、花、果實等部位，都有黃褐色絨毛。花單性，雌雄異株。黃白色壺形的花，開



放於葉腋。雄株開花量較多，具有芳香，是典型的蟲媒花。果實具有增大的宿存花萼，是柿樹家族的特徵之一。果實熟成為橘紅色，必須熟透落地，果肉才會味美香甜。

蟲屎名稱的由來有多種說法，一是在葉基靠近葉柄處，有一坨狀似蟲屎的腺體；另一說法則是全株密披黃褐色星狀毛，狀似蟲屎；還有另一種說法則是纍纍果實懸掛枝端，狀如蟲屎。無論真正的原因是什麼，都是方便大家記憶的說法。

蟲屎是喜好陽光的植物，是次生林的先驅植物，大多分布於低海拔山

區或是海岸林的開闊地，以南部較為常見。花單性，雄花的眾多雄蕊群聚成圓球狀，襯托著黃綠色的花被，綻放於枝端時，宛如晴天娃娃般可人。雌花則低調許多，密布黃褐色毛，柱頭3裂。雌花雄花有時生於同一花序，有時則為不同花序。果實結果量大，纍纍果串懸掛枝桠間，頗為可觀。



WILD
FRUITS


41

白色野果

小白頭翁

GRAPE-LEAF
ANEMONE

- ① 每年的六月是開花的季節。
- ② 眾多的雄蕊和許多離生的雌蕊群著生於圓球狀的花托。
- ③ 瘦果群集成圓球狀。
- ④ 果熟逐一分離，綿毛膨脹而外張。
- ⑤ 細小的瘦果混雜在綿毛之中，隨風飄飛。
- ⑥ 散盡後殘留的樣貌。



2

小檔案

學名	<i>Anemone vitifolia</i> var. <i>matsudae</i>
科屬	毛茛科銀蓮花屬
英名	Grape-leaf Anemone
型態	多年生直立草本，高約50-120公分。
分布	中高海拔山區，林緣、路邊或開闊地
特徵	根生葉叢生，莖生葉對生，三出複葉，中央小葉長於5 cm，兩側小葉歪斜，3深裂或不裂。花頂生，花被白色或淡紅，雄蕊多數，心皮多數。瘦果，密披純白色綿密細毛。
花期	5~8月
果期	9~12月
傳播方式	風力傳播



3